

## 中文說明

# TSUMURA 漢方葛根湯液 2

【第二類醫藥品】

### 功能和效果

用於中等體力以上人士的以下各種症狀：

感冒初期（不出汗型）、傷風、鼻炎、頭痛、肩酸、肌肉痛、手或肩膀痛

### 注意事項

#### □諮詢事項

1. 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

- (1) 正在接受醫生治療的人士
- (2) 孕婦或疑似懷孕的人士
- (3) 身體虛弱的人士（體力衰弱的人士、體質虛弱的人士）
- (4) 腸胃弱的人士
- (5) 容易出汗的人士
- (6) 老年人
- (7) 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士
- (8) 有以下症狀的人士：  
浮腫、排尿困難
- (9) 被診斷為患有以下疾病的人士：

高血壓、心臟病、腎臟病、甲狀腺機能障礙

2. 服用後如果出現以下症狀，則有可能是副作用，請立即停止服用，持本產品（盒子）諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症 狀
皮 膚	發疹、發紅、瘙癢
消化系統	噁心、食欲不振、胃部不適

偶爾可能會發生以下嚴重症狀。此時請立即接受醫生的診治：

症狀名稱	症 狀
假性醛固酮增多症、肌病	除手腳酸軟、麻痺、痙攣、僵硬外，還出現乏力感、肌肉痛，並逐漸增強
肝功能障礙	出現發熱、瘙癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身疲憊、食欲不振等

3. 如果服用1個月左右（針對感冒初期、傷風、頭痛服用時則服用5-6次）症狀仍未好轉，請停止服用，持本產品（盒子）諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

4. 如果需要長期連續服用，請諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。



## 用法和用量

請按以下用量，在餐間服用：

年 齡	1 次用量	1 天服用次數
15 歲及以上成人	1 瓶	2 次
未滿 15 歲	請勿服用	

請在服用前充分搖勻後服用。

<用法用量的相關注意事項>

請注意服用本劑時 1 次喝完 1 瓶，不要喝剩。

## 成分和含量

本品 1 天用量 90mL（45mL×2 瓶）中，含有從下述生藥中提取的葛根湯提取物 8.3g：

日本藥典葛根	8.0g
日本藥典麻黃	4.0g
日本藥典大棗	4.0g
日本藥典桂皮	3.0g
日本藥典芍藥	3.0g
日本藥典甘草	2.0g
日本藥典生薑	1.0g

有關添加物：含有轉化糖漿（白糖、果糖、葡萄糖）、日本藥典蜂蜜、日本藥典苯甲酸鈉、對羥基苯甲酸丁酯、乙醇、聚氧乙烯氫化蓖麻油、日本藥典檸檬酸水合物、日本藥典碳酸氫鈉、香料、乙基香蘭素、甘油、香草醛、1,2-丙二醇

## 標籤注意事項

- (1) 服用時，請仔細閱讀盒子背面的說明書。
- (2) 由於可能會有不適合服用的情形，因此服用前請先諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。
- (3) 請於陽光直接照射不到的陰涼之處保存。
- (4) 請於幼兒無法觸及之處保存。
- (5) 為避免誤用及為保持品質，請勿轉放入其他容器。
- (6) 請勿服用已過保質期的產品。

## 淨含量

45mL×2 瓶裝（1 天用量）

## 製造銷售商

大同藥品工業株式會社 郵遞區號：639-2121 奈良縣葛城市新村 214 番地 1

本產品依照日本法律取得生產、銷售許可。



郵遞區號：107-8521 東京都港區赤坂 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>